

BAB 6

PENUTUP

5.9 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penderita HIV/AIDS dengan TB paru lebih sering terjadi pada laki-laki, rentang usia 26-35 tahun, pendidikan menengah (SMU/SMK), belum menikah, dan memiliki pekerjaan wiraswasta.
2. Penderita HIV/AIDS dengan TB ekstra paru lebih sering terjadi pada laki-laki, rentang usia 26-35 tahun, pendidikan menengah (SMU/SMK), belum menikah dan menikah memiliki jumlah dan persentase yang sama, dan pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta.
3. Penderita HIV/AIDS dengan TB paru dan TB ekstra paru lebih sering terjadi pada laki-laki, rentang usia 26-35 tahun, pendidikan dasar, menengah (SMU/SMK), perguruan tinggi memiliki jumlah dan persentase yang sama, belum menikah dan menikah memiliki jumlah dan persentase yang sama, dan memiliki pekerjaan wiraswasta dan buruh/tani.

5.10 Saran

1. Pada pasien laki-laki dengan usia produktif disarankan untuk melakukan pemeriksaan TB paru (BTA sputum, rontgen toraks).
2. Pada pasien HIV dengan TB paru disarankan untuk kontrol teratur supaya tidak menyebar menjadi TB ekstra paru.
3. Semua pasien HIV yang memiliki BTA negatif disarankan untuk melakukan pemeriksaan *GeneXpert*.