

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian deskriptif prospektif yang dilakukan terhadap pasien IMA-EST yang menjalani reperfusi di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien tersebar pada usia rerata yang sedikit berbeda yaitu yang menjalani IKP primer (57.07 ± 10.1 tahun) dan fibrinolitik (50.93 ± 10.1 tahun), pada kedua jenis tindakan pasien terbanyak berjenis kelamin laki-laki, memiliki faktor risiko tertinggi merokok, mendapat pengobatan jangka panjang terbanyak antiplatelet, komorbid tertinggi yaitu pneumonia, komplikasi terbanyak pada pasien yang akan menjalani IKP primer yaitu aritmia dan pada fibrinolitik yaitu kejadian gagal jantung.
2. Pasien yang mendapat fibrinolitik mengalami KKM dalam 6 bulan paska rawatan lebih tinggi dibandingkan pasien yang menjalani IKP Primer.
3. Infark miokard berulang merupakan KKM dalam 6 bulan paska rawatan tertinggi yang ditemukan pada pasien IMA-EST yang menjalani reperfusi.

6.2 Saran

1. Perlu adanya penelitian analitik untuk mengetahui hubungan antar variabel.
2. Untuk institusi, perlu dilakukan evaluasi kepatuhan pengobatan jangka panjang pada pasien sehingga dapat menurunkan KKM 6 bulan paska rawatan pada pasien.