

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

7.1.1 Terdapat perbedaan faktor risiko antara PEAD dan PEAL pada variabel indeks massa tubuh dan tidak terdapat perbedaan pada variabel lainnya.

7.1.2 Terdapat perbedaan *maternal outcome* antara PEAD dan PEAL pada variabel tekanan darah diastolik, pernapasan, hemoglobin, hematokrit, trombosit, ureum, kreatinin darah, albumin, SGOT, SGPT, LDH, kalsium, natrium, dan kejadian sindrom HELLP dan tidak terdapat perbedaan pada variabel lainnya.

7.1.3 Terdapat perbedaan *fetal outcome* antara PEAD dan PEAL pada usia gestasi, berat badan lahir, panjang badan, skor APGAR, dan bayi yang membutuhkan fasilitas PICU dan bantuan napas dan tidak terdapat perbedaan pada variabel lainnya.

7.2 Saran

7.2.1 Sebaiknya penelitian dilakukan dengan metode kohort dengan pemantauan *Antenatal Care* sehingga awitan preeklampsia yang didapatkan lebih akurat dan keadaan spesifik pada kehamilan dapat diketahui.

7.2.2 Sebaiknya penelitian dilakukan dengan melihat rekam medik bagian Perinatologi sehingga keadaan bayi dari subjek penelitian dapat diketahui secara spesifik.



