

BAB 7 PENUTUP

7.1 Simpulan

1. Penderita PGK yang menjalani hemodialisis ≤ 1 tahun adalah sebanyak 71,4%, dan >1 tahun adalah 28,6%
2. Rerata kadar albumin pasien yang menjalani hemodialisis ≤ 1 tahun adalah 3,2 g/dL dan >1 tahun adalah 3,0 g/dL
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara rerata kadar albumin penderita PGK yang menjalani hemodialisis ≤ 1 tahun dengan yang menjalani hemodialisis >1 tahun.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kriteria sampel yang dieksklusikan seperti usia lanjut, DM, inflamasi (non infeksi/infeksi), *peripheral vascular disease*, merokok dan *intake* protein pasien
2. Adanya keseragaman rentang waktu pemeriksaan kadar albumin serum sebelum hemodialisis berikutnya
3. Perlu adanya perbaikan kadar albumin serum yang rendah pada penderita PGK yang menjalani hemodialisis rutin, baik yang baru maupun yang sudah lama menjalani terapi. Perbaikan kadar albumin serum dapat dilakukan dengan memperbaiki asupan protein pasien atau dengan terapi albumin.