

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang potensi interaksi obat-obat parenteral pada pasien neonatus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi interaksi obat-obat parenteral pada pasien neonatus terjadi pada 155 pasien (78,28%) .
2. Kombinasi obat-obat parenteral paling banyak yang menyebabkan terjadinya potensi interaksi obat adalah ampisilin sulbaktam-gentamisin yaitu 139 kasus, sefoperazon sulbaktam-gentamisin yaitu 22 kasus.
3. Tingkat keparahan potensi interaksi obat yaitu interkasi mayor pada 2 kasus, interaksi moderat terjadi pada 181 kasus, dan interaksi minor terjadi pada 3 kasus.
4. *Outcome* klinis pasien neonatus adalah 42,42% meninggal, 36,36% dengan keadaan sembuh, 12,62% dalam keadaan belum sembuh (pulang paksa atas keinginan sendiri), dan 8,58% membaik.
5. Tidak ada faktor yang mempengaruhi potensi interaksi obat-obat parenteral pada pasien neonatus.

5.2 Saran

Perlunya dilakukan penelitian secara prospektif dengan meneliti faktor-faktor lain yang diduga berhubungan yang tidak diteliti dalam penelitian ini.