

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat kecenderungan rerata tekanan intraokuler yang lebih tinggi pada miopia tinggi daripada rerata tekanan intraokuler pada miopia ringan, namun secara statistik hubungan tersebut tidak bermakna.
2. Terdapat kecenderungan rerata tekanan intraokuler yang lebih tinggi pada miopia tinggi daripada rerata tekanan intraokuler pada miopia sedang, namun secara statistik hubungan tersebut tidak bermakna.

#### **7.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran, antara lain:

1. Memelihara kesehatan mata terutama pada mahasiswa kedokteran sebagai salah satu kelompok yang paling berisiko untuk mengalami miopia yang merupakan salah satu penyebab terancamnya penglihatan.
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan miopia dengan tekanan intraokuler pada mahasiswa kedokteran dengan proporsi sampel antara miopia ringan, sedang, dan tinggi yang seimbang.
3. Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan miopia dengan tekanan intraokuler pada mahasiswa kedokteran dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tekanan intraokuler.