

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami KIPI setelah mendapatkan imunisasi DPT di Puskesmas Seberang yaitu sebanyak 41 orang (91,1%) dan anak yang tidak mengalami KIPI yaitu sebanyak 4 orang (8,9%).
2. Gejala KIPI DPT yang paling banyak dialami anak di Puskesmas Seberang Padang Kota Padang adalah demam (82,9%), pembengkakan dilokasi penyuntikan (75,6%), kemerahan dilokasi penyuntikan (63,4%).
3. Hampir semua awitan gejala KIPI DPT terjadi pada hari pertama setelah imunisasi
4. Hampir semua gejala KIPI DPT menetap selama satu hari sampai seminggu setelah imunisasi.

#### **6.2 Saran**

##### **1. Bagi Tenaga Kesehatan**

Diharapkan bagi petugas kesehatan agar dapat meningkatkan promosi kesehatan tentang KIPI terutama untuk pengobatan yang dapat dilakukan oleh ibu jika anak mengalami KIPI.

##### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam lagi dan dalam cakupan yang lebih luas.