


**HUBUNGAN KARAKTERISTIK REMAJA PUTRI DENGAN KEJADIAN
DISMENOREA PRIMER PADA SISWI KELAS X DAN XI DI SMAN 1
KOTA PADANG TAHUN 2017**

Oleh

TITIA FEBRI MONICA

No.BP. 1310331029



Dosen Pembimbing

dr. Firdawati, M.Kes, PhD

Bd. Sunesni SST, M.Biomed

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2018**

**BACHELOR MIDWIFERY PROGRAM
FACULTY OF MEDICINE
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate theses, February 2018

TITIA FEBRI MONICA, No. BP. 1310331029

**RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTIC OF TEENAGE GIRLS WITH
PRIMARY DISMENOREA INCIDENCE AMONG FEMALE STUDENTS IN
GRADE X AND GRADE XI AT SENIOR HIGH SCHOOL 1 PADANG CITY IN 2017**

xxiii + 75 pages, 9 tables, 2 pictures, 8 attachments

ABSTRACT

Background and study aims

Primary dysmenorrhea is a painful cramp in the lower abdomen that occurs before or during menstruation. In senior high school 1 Padang City, students in grade X and XI the incidence of primary dysmenorrhea is still high. The impact of primary dysmenorrhea are decreased productivity, skipping school, and feeling disturbed during activities. The aim of this study is to determine the relationship between characteristic of teenage girls with primary dysmenorrhea incidence among female students in grade X and XI at senior high school 1 Padang City in 2017.

Metode

This was quantitative with cross sectional study design conducted at senior high school 1 Padang City on November 2016 – Februari 2018. Population and sample of this study are student in grade X and XI counted 106 people. Data collected by using proportional stratified random sampling. Data analysis was performed using univariate and bivariate with chi-square test, with 95% Interval confidence $\alpha = 0,05$.

Result

The results showed 74.5% of student grade X and XI had primary dysmenorrhea. The result chi square test showed menstrual there is no relationship between menstrual period ($p = 0,094$), there was relationship between age of menarche ($p = 0,012$), nutritional status ($p = 0,001$) and sport habit ($p = 0,003$) with incidence primary dysmenorrhea at grade X and XI in senior high school 1 Padang City in 2017.

Conclusion

There was a relationship between age of menarche, nutritional status, and sport habit with the incidence of primary dysmenorrhea

References : 55 (2004 - 2017)

Keywords : Characteristic of teenage girls, Primary dysmenorrhea incidence

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Februari 2018

TITIA FEBRI MONICA, No. BP. 1310331029

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK REMAJA PUTRI DENGAN KEJADIAN
DISMENOREA PRIMER PADA SISWI KELAS X DAN XI DI SMAN 1
KOTA PADANG TAHUN 2017**

xxiii + 75 halaman, 9 tabel, 2 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Dismenorea primer adalah nyeri kram di perut bagian bawah yang terjadi sebelum atau selama menstruasi. Di SMAN 1 Kota Padang pada siswi kelas X dan XI, kejadian *dismenorea primer* masih tinggi. Dampak *dismenorea primer* adalah produktivitas menurun, bolos sekolah, dan merasa terganggu saat beraktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik remaja putri dengan kejadian *dismenorea primer* pada siswi kelas X dan XI di SMA Negeri 1 kota Padang tahun 2017.

Metode

Penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectiona study*, dilakukan di SMAN 1 Kota Padang pada November 2016 – Februari 2018. Populasi dan sampel penelitian adalah siswi kelas X dan XI sebanyak 106. Pengumpulan data dengan cara *proporsional stratified random sampling*. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *chi-square*, dengan derajat kepercayaan 95% $\alpha=0,05$.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan 74,5% siswi kelas X dan XI mengalami *dismenorea primer*. Hasil uji *chi-square* menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lama menstruasi ($p=0,094$) dan terdapat hubungan antara umur *menarche* ($p=0,012$), status gizi ($p=0,001$) dan kebiasaan olahraga ($p=0,003$) dengan kejadian *dismenorea primer* pada siswi kelas X dan XI di SMAN 1 Kota Padang tahun 2017.

Kesimpulan

Terdapat hubungan antara umur *menarche*, status gizi dan kebiasaan olahraga dengan kejadian *dismenorea primer*.

Daftar Pustaka : 55 (2004 - 2017)

Kata Kunci : Karakteristik remaja putri, kejadian *dismenorea primer*

