

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejadian LMA pada lansia lebih sering terjadi pada laki laki, rerata usia 65 tahun, dan menunjukkan de novo LMA.
2. Hasil laboratorium darah tepi post kemoterapi menunjukkan sebagian besar pasien mengalami anemia ringan, leukopenia, dan trombositopenia, selain itu terjadi penurunan jumlah blast setelah kemoterapi.
3. Gambaran respon kemoterapi pada pasien lansia dengan LMA di RSUP Dr. M Djamil Padang menunjukkan bahwa kurang lebih seperlima pasien mengalami remisi komplit sedangkan setengah pasien tidak respon terhadap pengobatan.

6.2 Saran

1. Peneliti menyarankan kepada pihak RSUP Dr. M Djamil Padang terutama bagian rekam meningkatkan penjagaan dan pengelolaan rekam medis karena pada penelitian ini banyak data yang dibutuhkan tidak lengkap.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kelengkapan data yang dicantumkan di rekam medik dan meningkatkan pelayanan dan fasilitas perawatan karena pasien lansia dengan LMA post kemoterapi sangat rentan mengalami infeksi terutama sepsis yang bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan sitogenetik juga perlu dilakukan agar pengobatan yang diberikan lebih optimal.
3. Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai LMA dengan desain prospektif agar lebih diketahui faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap respon kemoterapi pasien LMA.