

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien HPP di RSUP Dr. M. Djamil Padang Januari 2016-September 2017, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis HPP terbanyak adalah HPP Primer.
2. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan usia 21-34 tahun.
3. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan paritas lebih dari 2 kali atau multipara.
4. Pasien HPP di RSUP Dr. M. Djamil memiliki tingkat kepatuhan ANC yang tinggi atau 100 % melakukan kontrol selama kehamilannya rutin.
5. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan jarak antara kelahiran < 2 tahun.
6. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan tidak ada riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk.
7. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan kadar Hb < 11 gr%
8. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan tingkat pendidikan tinggi.
9. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan penyebab retensio plasenta.
10. Pasien HPP yang mengalami kematian ditemukan pada ibu dengan HPP primer.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi kesehatan, khususnya instalasi rekam medik RSUP Dr. M. Djamil Padang disarankan untuk memperbarui sistem pencatatan dan pengumpulan rekam medik supaya kejadian hilang dan salahnya pengelompokkan rekam medik berdasarkan diagnosis penyakit pasien tidak terulang kembali.

2. Bagi tenaga kesehatan sebaiknya mengisi data rekam medik dengan lengkap, mendeteksi lebih dini ibu hamil yang berisiko pada layanan primer, dan segera merujuk pasien yang berisiko terjadinya HPP saat persalinan ke layanan sekunder maupun tersier sehingga dapat mencegah peningkatan angka kematian setiap tahunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian analitik untuk masing-masing faktor yang mempengaruhi kejadian HPP sehingga didapatkan faktor terbesar yang menyebabkan HPP dan dapat segera ditanggulangi segera.
4. Bagi masyarakat sebaiknya setelah mengetahui faktor-faktor risiko yang menyebabkan HPP dapat lebih mawas diri akan terjadinya HPP seperti pada ibu dengan usia 21-34 tahun dapat melakukan kontrol ANC lebih rutin, dimana pada salah satu program ANC yaitu minum tablet Fe yang dapat mencegah kejadian anemia. Ibu juga dapat mengikuti program KB dimana dapat mengatur jumlah kelahiran anak dan jarak antara kelahirannya.

