

**PROFIL PASIEN HEMORRHAGIC POST PARTUM DI RSUP
DR. M. DJAMIL PADANG**



Skripsi

**Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kedokteran**

Oleh

JIHAN WAFDA RAMADHAN

NIM : 1410312038

**Pembimbing : Dr. dr. Rosfita Rasyid, M.Kes
dr. Dewi Rusnita, M.Sc**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

HEMORRHAGIC POSTPARTUM'S PROFILE IN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

By

Jihan Wafda Ramadhan

ABSTRACT

Hemorrhagic postpartum is the first cause of maternal mortality in the world (35 %). Risk factors of HPP are age, number of parity, birth interval, ANC, history of pregnancy and delivery, anemia, and education level. This study aimed to know the hemorrhagic post partum's profile in RSUP Dr. M. Djamil Padang in Januari 2016-September 2017.

This study was retrospective descriptive with cross sectional design. Sample size were 39 samples of patients's medical record of RSUP Dr. M. Djamil Padang from January 2016 until September 2017 collected with simple random sampling technique. Data was computerized with univariat analityc

This study shows the most HPP that happened in RSUP Dr. M. Djamil are early HPP (79,5%), mother aged 21-34 (69,2%), two or more parities (89,4%), ANC adherence (100%), less than 2 years birth interval (66,7%), no poor history of pregnancy and delivery (66,7%), Hb <11 gr% (92,4%), high education level (87,2%), HPP caused by retentio placenta (38,5%), and the mortality found in early HPP (2,5%).

It could be concluded that mother aged 21-34, multipara, ANC adherence, less than 2 years birth interval, no poor history of pregnancy and delivery, Hb <11 gr%, high education level were happen on HPP in RSUP-Dr. M. Djamil.

Key Words : maternal mortality rate, hemorrhagic post partum (HPP), risk factors of HPP.

PROFIL PASIEN HEMORRHAGIC POST PARTUM DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Oleh
Jihan Wafda Ramadhan

ABSTRAK

Perdarahan post partum menduduki peringkat pertama dalam menyumbangkan angka kematian ibu di dunia, yaitu sebesar 35 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian HPP yaitu usia, jumlah paritas, jarak antar kelahiran, ANC, riwayat persalinan dan kehamilan sebelumnya, anemia, dan tingkat pengetahuan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran profil pasien hemorrhagic post partum di RSUP Dr. M. Djamil periode Januari 2016- September 2017.

Penelitian ini merupakan deskriptif retrospektif dengan desain *cross sectional*. Sampel berjumlah 39 sampel berupa rekam medis pasien dari bagian rekam medis RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Januari 2016- September 2017 dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dan analisis univariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPP terbanyak yang terjadi di RSUP Dr. M. Djamil adalah HPP Primer (79,5 %), ibu dengan usia 21-34 tahun (69,2%), ibu dengan paritas lebih dari 2 kali atau multipara (89,4%), ibu dengan tingkat kepatuhan ANC yang tinggi (100 %), ibu dengan jarak antara kelahiran < 2 tahun (66,7%), ibu yang tidak ada riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk (66,7%), ibu dengan kadar Hb < 11 gr% (92,4%), ibu dengan tingkat pendidikan tinggi (87,2%), ibu dengan etiologi retensio plasenta (38,5%), dan kematian ditemukan pada ibu dengan HPP primer (2,5%).

Kesimpulan penelitian ini adalah ibu bersalin yang memiliki usia 21-34 tahun, multipara, ANC teratur, jarak antara kelahiran < 2 tahun, tidak ada riwayat kehamilan dan persalinan buruk, Hb < 11 gr%, tingkat pendidikan tinggi, dan dengan penyebab retensio plasenta adalah ibu yang mengalami HPP di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Kata kunci : angka kematian ibu, hemorrhagic postpartum (HPP), faktor faktor risiko HPP.