

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian tentang gambaran penderita sirosis hepatis berdasarkan skoring klasifikasi *Child Turcotte Pugh* dan penyebab kematian di Bagian Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Frekuensi klasifikasi *Child Turcotte Pugh* pada pasien sirosis hepatis meninggal yang terbanyak adalah CTP-C, dilanjutkan dengan CTP-B dan tidak ada pasien sirosis hepatis dengan CTP-A yang meninggal dunia.
2. Frekuensi penyebab pasien sirosis hepatis meninggal yang terbanyak karena ensefalopati hepaticum, diikuti sepsis akibat peritonitis bakterial spontan, perdarahan varises esofagus, *hepatocellular carcinoma*, sepsis akibat infeksi lain dan tidak ditemukan pasien sirosis hepatis yang meninggal karena sindroma hepatorenal.

6.2 Saran

Berdasarkan proses dan hasil dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang mungkin bermanfaat:

1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan secara lengkap dan teliti untuk mempermudah dalam penegakan diagnosis dan sebagai kelengkapan data pasien di rumah sakit.
2. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin, seperti kadar bilirubin, albumin dan waktu protrombin untuk mempermudah dalam menentukan prognosis sirosis hepatis dengan klasifikasi *Child Turcotte Pugh*.