

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium pasien sindrom HELLP pada kasus preeklampsia di RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan rerata kadar LDH 1644 IU/L, median AST 113 IU/L, dan jumlah trombosit $64779 /mm^3$.
2. Tingkat morbiditas pasien sindrom HELLP pada kasus preeklampsia di RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan kejang sebanyak 41,7%, udem paru sebanyak 4,2%, dan DIC 8,3%.
3. Sebanyak lebih dari 50% mengalami udem paru pada kadar LDH $>350-1400$ IU/L dan kadar AST $>35-150$ IU/L. Seluruh pasien sindrom HELLP mengalami DIC pada kadar LDH >1400 IU/L, kadar AST >150 IU/L dan jumlah trombosit $<50.000/mm^3$. Lebih dari 50% pasien sindrom HELLP mengalami kejang pada kadar LDH $>350-1400$ IU/L, kadar AST 35-150 IU/L dan jumlah trombosit $<50.000/mm^3$.

7.2 Saran

1. Perludilakukanpenelitian terhadap faktor-faktor bias yang memengaruhi hasil penelitian.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode kohort untuk mengetahui pengaruh kadar LDH, AST dan jumlah trombosit terhadap morbiditas pasien sindrom HELLP.