

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi penderita HIV berdasarkan jenis kelamin hampir separuh sampel terjadi pada laki-laki pada dua kelompok, yaitu HIV dengan diare kronik maupun HIV tanpa diare kronik
2. Distribusi penderita HIV berdasarkan rentang usia sebagian besar terjadi pada usia 21-40 tahun pada kelompok HIV dengan diare kronik maupun HIV tanpa diare kronik
3. Distribusi penderita HIV berdasarkan infeksi oportunistik penyerta terbanyak pada penderita HIV dengan diare kronik berturut-turut adalah tuberkulosis, candidiasi oral, pnemonia pneumocystis dan toxoplasmosis serebri, sedangkan pada penderita HIV tanpa diare kronik adalah tuberkulosis, candidiasi oral, dan toxoplasmosis serebri
4. Distribusi penderita HIV berdasarkan jumlah CD4, ditemukan $CD4 < 200mm^3$ paling banyak ditemukan pada dua kelompok HIV dengan diare kronik maupun tanpa diare kronik.
5. Tidak terdapat hubungan antara jumlah sel T CD4 dengan kejadian diare kronik pada pasien HIV

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan untuk klinisi agar melakukan pemeriksaan analisis feses pada pasien yang terduga mengalami diare kronik untuk mengetahui etiologi penyebab sehingga penatalaksanaan yang dilakukan sesuai dengan etilogi penyebab.
2. Perlu dilakukan peneitian lebih lanjut dengan desain penelitian case kontrol untuk meminimalkan pengaruh variabel-variabel perancu.