

B A B VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan:

1. Rerata nilai *prothrombin time* (PT) pada pasien ulkus kaki diabetes mellitus adalah $12,7 \pm 1,446$
2. Rerata nilai *activated partial thromboplastin time* (APTT) pada pasien ulkus kaki diabetes mellitus adalah $42,65 \pm 5,98$
3. Tidak terdapat hubungan PT dengan klasifikasi wagner pada ulkus kaki diabetes di RSUP. DR. M. Djamil Padang dengan taraf signifikan (p) 0,255 ($p > 0,05$)
4. Tidak terdapat hubungan APPT dengan klasifikasi wagner pada ulkus kaki diabetes di RSUP. DR. M. Djamil Padang dengan taraf signifikan (p) 0,237 ($p > 0,05$)

7.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan deteksi secara dini keadaan koagulasi darah dengan melaksanakan pemeriksaan penyaring hemostasis pada setiap penderita ulkus kaki diabetika sebelum pemberian terapi

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan marker pemeriksaan yang lebih spesifik untuk mengetahui nilai koagulasi pada penderita ulkus kaki diabetika.

