

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. HRQoL pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang termasuk dalam kategori sedang.
2. Siklus kemoterapi dan setting kemoterapi mempengaruhi nilai HRQoL pasien kanker payudara. Dimana pasien yang menjalani siklus kemoterapi ke-I lebih baik HRQoL-nya dibanding pasien yang menjalani siklus lain dan pasien yang mendapatkan setting kemoterapi adjuvan (setelah bedah) memiliki nilai HRQoL yang lebih baik dibandingkan pasien yang mendapatkan setting kemoterapi neoadjuvan (sebelum bedah). Sedangkan umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, lama terdiagnosa, dan jenis kemoterapi tidak berpengaruh terhadap terhadap nilai HRQoL pasien kanker payudara ($p>0,05$).
3. Domain yang memberikan pengaruh besar terhadap tingginya kualitas hidup pasien kanker payudara adalah fungsi kognitif dan gejala diare. Sedangkan yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup pasien kanker payudara adalah domain fungsi sosial dan gejala mual dan muntah.

5.2 Saran

1. Penilaian HRQoL pasien kanker payudara perlu dilakukan secara berkala untuk memahami kondisi pasien kanker payudara sehingga membantu perencanaan terapi pada pasien kanker payudara lebih optimal.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah dan menyeragamkan jumlah responden berdasarkan karakteristik demografi pasien agar mendapatkan hasil yang lebih representatif.

