



UNIVERSITAS ANDALAS

**ANALISIS HUBUNGAN POLA ASUH DENGAN KEJADIAN
STUNTING PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN
DI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2018**

Oleh :

DIAR ANDIKA PUTRA

No. BP. 1311211052

Pembimbing I : Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed

Pembimbing II : Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2018

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2018

DIAR ANDIKA PUTRA, No. BP. 1311211052

**ANALISIS HUBUNGAN POLA ASUH DENGAN KEJADIAN *STUNTING*
PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN
2018**

xii+ 75 halaman, 16 tabel, 3 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel independen (pola asuh makan, pola asuh psikososial, dan pola asuh kesehatan) terhadap variabel dependen (*stunting*) dengan melihat variabel *confounding* lain yang berhubungan dengan kejadian *stunting* pada anak usia 3-5 tahun di kabupaten tanah datar tahun 2018.

Metode

Penelitian ini merupakan studi penelitian analitik dengan disain kasus kontrol dengan *match* tinggi badan ibu dan jenis kelamin anak pada anak usia 3-5 tahun dengan perbandingan sampel 1:2. Jumlah sampel adalah 90 orang yang terdiri dari 30 kasus dan 60 kontrol. Data diperoleh dengan pengukuran langsung, wawancara dan observasi. Data dianalisa secara univariat, bivariat dan multivariat menggunakan *stata* versi 14.2 dengan uji *mc nemar* dan *regresi logistic* pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil

Hasil analisis bivariat menemukan variabel yang berhubungan dengan kejadian *stunting* yaitu Pola asuh makan OR=0,114 (95%CI 0,029-0,319), pola asuh kesehatan OR=0,406 (95%CI 0,195-0,795), pola asuh psikososial OR=0,117 (95%CI 0,030-0,329), status ekonomi OR=0,114 (95%CI 0,029-0,319), perokok pasif ibu OR=2,4 (95%CI 1,106-5,623), dan pengetahuan gizi ibu OR=0,238 (95%CI 0,106-0,482). Hasil model multivariat menunjukkan pengetahuan gizi ibu, perokok pasif ibu dan status ekonomi *confounding* terhadap hubungan pola asuh makan dengan kejadian *stunting*. Pemodelan akhir multivariat menunjukkan pola asuh psikososial, pola asuh makan dan status ekonomi memiliki risiko paling tinggi terhadap kejadian *stunting*.

Kesimpulan

Pengetahuan gizi ibu, perokok pasif ibu, dan status ekonomi memiliki pengaruh terhadap hubungan pola asuh makan dengan kejadian *stunting*. Pola asuh psikososial, pola asuh makan dan status ekonomi merupakan variabel determinan terhadap kejadian *stunting*. Diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka : 60 (1996-2018)

Kata Kunci : *Stunting*, *confounding*, pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola asuh psikososial.

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, July 2018

DIAR ANDIKA PUTRA, No. BP. 1311211052

**ANALYSIS OF ASUH PATTERN RELATIONSHIP WITH STUNTING
EVENTS IN CHILDREN AGE 3-5 YEARS IN LAND DISTRICT DATAR
YEAR 2018**

xii + 75 pages, 16 tables, 3 pictures, 8 appendices

ABSTRACT

Objective

This study aims to examine the relationship of independent variables (eating patterns, psychosocial parenting, and health care patterns) to the dependent variable (stunting) by looking at other confounding variables related to stunting events in children aged 3-5 years in the district of flat land years 2018.

Method

This study is an analytical study with case control design matched maternal height and gender of children in children aged 3-5 years with a sample ratio of 1: 2. The sample size is 90 people consisting of 30 cases and 60 controls. Data were obtained by direct measurement, interview and observation. Data were analyzed by univariate, bivariate and multivariate using stata version 14.2 with mc nemar test and logistic regression at 95% confidence level.

Result

The result of bivariate analysis found that the variables related to the stunting event were OR = 0,114 (95% CI 0,029-0,319), health care OR = 0,406 (95% CI 0,195-0,795), psychosocial care OR = 0,117 (95% CI 0,030-0,329), economic status OR = 0,114 (95% CI 0,029-0,319), passive smoking mother OR = 2,4 (95% CI 1,106-5,623), and mother nutrition knowledge OR = 0,238 (95% CI 0,106- 0,482). The multivariate model results show mother's maternal, passive maternal smoking and economic confounding status on the relationship of feeding pattern with stunting event. End-multivariate modeling shows that psychosocial upbringing, eating patterns and economic status have the highest risk of stunting events.

Conclusion

Maternal nutritional knowledge, maternal passive smoking, and economic status have an influence on the relationship between eating patterns and stunting events. Psychosocial upbringing pattern, eating pattern and economic status is the determinant variable to stunting event. It is expected that the government and the community can work together to control the problem.

References : 60 (1996-2018)

Keywords : Stunting, confounding, eating patterns, health care patterns, psychosocial care.