

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang kajian penggunaan statin pada pasien Stroke Iskemik di Instalasi Rawat Inap Neurologi RSUP. Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik pasien stroke iskemik yang paling banyak didiagnosa di RSUP. Dr. M. Djamil Padang selama tahun 2017 adalah jenis kelamin perempuan sebesar 50,2% dengan rentang umur 56-65 tahun sebesar 32,2%, tingkat pendidikan SMA sebesar 39,6%, status pekerjaan terbesar adalah IRT sebesar 35,9%.
2. Pola penggunaan obat pada pasien stroke iskemik di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2017 didapatkan pasien yang menggunakan statin adalah sebesar 16,5% (45 pasien) dan pasien yang tidak menggunakan statin adalah sebesar 83,5% (228 pasien). Statin yang paling banyak digunakan adalah simvastatin yaitu sebesar 77,8% (35 pasien).
3. Evaluasi penggunaan statin di Instalasi Rawat Inap Neurologi RSUP. Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2017 didapatkan 100% tepat indikasi, 100% tepat obat, 100% tepat pasien, 100% tepat dosis dan 57,8% terdapat potensi interaksi obat.

5.2 Saran

1. Disarankan agar farmasis ikut berpartisipasi dalam pemantauan terapi obat, supaya dapat mendeteksi secara dini efek samping yang ditimbulkan dalam pemakaian statin.
2. Disarankan agar pada saat pasien didiagnosis stroke iskemik apoteker berperan dalam memberikan konseling tentang kepatuhan dalam meminum obat agar efektifitas tercapai dan mengurangi efek samping obat.
3. Perlu adanya peran farmasis dalam mengkaji peresepan yang telah diberikan pada pasien stroke iskemik, terutama mengenai akibat dan manfaat yang berfokus pada penggunaan statin.

