

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Kadar plasma $A\beta_{42}$ pada pasien geriatri berada di bawah nilai normal.
2. Kadar plasma $A\beta_{42}$ pada pasien geriatri kognitif normal berada di nilai normal.
3. Kadar plasma $A\beta_{42}$ pada pasien geriatri MCI berada di bawah nilai normal.
4. Kadar plasma $A\beta_{40}$ pada pasien geriatri berada di nilai normal.
5. Kadar plasma $A\beta_{40}$ pada pasien geriatri kognitif normal dan MCI berada di nilai normal.
6. Kadar plasma $A\beta_{42}$ lebih rendah secara bermakna pada kelompok MCI dibandingkan dengan kelompok kognitif normal.
7. Kadar plasma $A\beta_{40}$ lebih rendah pada kelompok MCI dibandingkan kelompok kognitif normal, namun tidak bermakna secara statistik.
8. Rasio $A\beta_{42}/A\beta_{40}$ lebih rendah secara bermakna pada kelompok MCI dibandingkan dengan kelompok kognitif normal.

7.2. Saran

1. Perlu dipertimbangkan pemeriksaan kadar plasma $A\beta_{42}$ dan rasio $A\beta_{42}/A\beta_{40}$ pada pasien geriatri.
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat perjalanan penyakit seperti pemantauan fungsi kognitif dan kadar plasma amyloid beta.