

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian hubungan kolesteatom dengan kejadian komplikasi pada pasien otitis media supuratif kronis di RSUP M. Djamil Padang, maka dapat disimpulkan:

1. Sebagian besar dari pasien OMSK menderita OMSK tipe bahaya (dengan kolesteatom).
2. Sebagian besar pasien OMSK adalah dewasa (≥ 18 tahun) dan berjenis kelamin laki-laki.
3. Lebih dari tiga perempat pasien OMSK tidak mengalami komplikasi.
4. Lebih dari setengah pasien OMSK dengan komplikasi mengalami komplikasi intratemporal.
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara kolesteatom dengan komplikasi pada pasien OMSK.
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan komplikasi pada pasien OMSK tipe bahaya.

7.2 Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan segera ke pelayanan kesehatan jika mengalami gejala OMSK (keluar cairan dari liang telinga, gangguan pendengaran, vertigo, nyeri telinga, perforasi membran timpani), untuk mendapatkan tatalaksana sehingga penyakit tidak berlanjut menimbulkan komplikasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan desain *cohort study*, untuk mencari hubungan kausatif yang lebih kuat antara kolesteatom dan komplikasi OMSK. Perlu dilakukan penelitian lebih spesifik terutama terkait perbedaan karakteristik dari ada tidaknya kolesteatom pada OMSK dan perbedaan karakteristik dari pasien anak-anak yang mengalami komplikasi dengan tidak komplikasi pada OMSK tipe bahaya, yang berguna sebagai deteksi dini sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi OMSK.

