


BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 
- 7.1.1 Rerata kadar vitamin C pada kejadian abortus lebih rendah dibandingkan kehamilan normal.
 - 7.1.2 Rerata kadar vitamin C pada kehamilan normal < 20 minggu lebih tinggi dibandingkan abortus.
 - 7.1.3 Rerata kadar MDA pada kejadian abortus lebih rendah dibandingkan kehamilan normal.
 - 7.1.4 Rerata kadar vitamin C pada kehamilan normal < 20 minggu lebih tinggi dibandingkan abortus.
 - 7.1.5 Terdapat kecenderungan peran kadar Vitamin C pada kejadian abortus dan kehamilan normal, tetapi tidak bermakna secara statistik.
 - 7.1.6 Terdapat kecenderungan peran Kadar MDA pada kejadian abortus dan kehamilan normal, tetapi tidak bermakna secara statistik.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan :

- 7.2.1 Sebelum pemeriksaan kadar vitamin C dilakukan pengkajian konsumsi makanan sumber vitamin C dan suplemen vitamin C.
- 7.2.2 Melakukan pemeriksaan rutin ANC dari Trimester I hingga Trimester III untuk dapat mencegah dini abortus yang mengancam.
- 7.2.3 Melakukan penelitian vitamin C dan MDA pada abortus Imminens.

