

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapatnya perbedaan rerata kadar vitamin C serum dengan ketuban pecah dini dan kehamilan normal.
2. Terdapatnya perbedaan rerata kadar MMP-2 serum dengan ketuban pecah dini dan kehamilan normal.
3. Tidak terdapat hubungan kadar vitamin C dan MMP-2 serum dengan ketuban pecah dini.
4. Tidak terdapat hubungan kadar vitamin C dan MMP-2 serum kehamilan normal.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Perlu adanya pemeriksaan untuk melihat kadar Vitamin C dan MMP-2 serum yang dapat digunakan sebagai parameter untuk membantu diagnostik ketuban pecah dini.
2. Perlu adanya peningkatan asupan vitamin C melalui suplementasi vitamin C pada ibu hamil untuk dapat mencegah risiko ketuban pecah dini.



3. Perlu adanya penelitian prospektif atau eksperimen untuk melihat pengaruh suplementasi vitamin C dan penurunan kadar MMP-2 serum untuk melihat kejadian ketuban pecah dini.

