

BAB 6 KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Tumor kepala dan leher yang paling banyak ditemukan adalah jenis tumor jinak kepala dan leher.
2. Kejadian tumor kepala dan leher berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak ditemukan pada laki-laki, baik untuk tumor jinak maupun tumor ganas.
3. Berdasarkan usia, tumor kepala dan leher paling banyak ditemukan pada usia di atas 50 tahun, baik untuk tumor jinak maupun tumor ganas.
4. Lokasi tumor kepala dan leher yang paling banyak ditemukan pada tumor jinak adalah hidung dan sinus paranasal, sedangkan untuk tumor ganas adalah nasofaring.
5. Jenis histopatologi tumor jinak yang paling banyak ditemukan adalah adenoma pleomorfik.
6. Jenis histopatologi tumor ganas yang paling banyak adalah karsinoma sel skuamosa.

1.2 Saran

Disebabkan penelitian ini bersifat deskriptif, pada satu institusi yang belum bias menggambarkan epidemiologi di klinis, sehingga diperlukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan beberapa institusi patologi lainnya.