BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- Pasien HIV/AIDS dengan tuberkulosis lebih sering ditemukan pada pria, pada kelompok usia 31-40 tahun, dengan jumlah CD4 <200 dan pada umumnya pasien HIV/AIDS dengan TB memiliki gejala (simptomatis).
- 2. Gambaran tuberkulosis *post primer* lebih banyak ditemukan pada pasien HIV/AIDS dengan TB di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016.
- 3. Gambaran tuberkulosis *post primer* lebih sering ditemukan pada pasien HIV-TB dengan jumlah CD4 <200 maupun CD4 >200.

6.2 Saran

- 1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel penelitian lebih banyak agar lebih representatif terhadap populasi pasien HIV-TB.
- 2. Diperlukan penelitian lanjutan dengan desain penelitian analitik mengenai gambaran tuberkulosis primer dan *post primer* pada pasien HIV/AIDS dengan TB berdasarkan CD4.
- 3. Rumah sakit diharapkan memperbanyak stok reagen CD4.
- 4. Pengarsipan rekam medik diharapkan lebih teliti lagi agar tidak ada data CD4 maupun kertas *expertise* yang hilang/tercecer.