

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang korelasi kadar albumin dengan lama rawat inap pasien *post* laparotomi di IRNA bedah Rumah Sakit DR M Djamil Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-rata kadar albumin responden adalah $2,96 \pm 0,63$ g%.
2. Nilai tengah lama rawat inap responden adalah $9,00 \pm 4,92$ hari.
3. Korelasi kadar albumin dengan lama rawat memiliki kekuatan hubungan yang sangat lemah dan berpola negatif, artinya semakin tinggi kadar albumin, semakin singkat lama rawat pasien. Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara kadar albumin dengan lama rawat inap pasien *post* laparotomi di IRNA bedah Rumah Sakit DR M Djamil Padang.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah :

1. Pemberian albumin pada pasien dengan diagnosis penyakit hepar dan kadar albumin kurang dari 3g% perlu dipertimbangkan karena harganya yang mahal dan ternyata memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap lama rawat inap pasien. Pemberian albumin sebaiknya lebih selektif sesuai indikasi dan pengobatan ditujukan pada penyakit yang mendasarinya.
2. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan desain yang lebih baik untuk melihat manfaat pemberian albumin pada pasien *post* laparotomi.