

ABSTRAK

Karakteristik Klinis dan Patologis Karsinoma Laring di Bagian THT-KL RSUP DR. M. Djamil Padang Periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2014

Oleh :

ARZIA RAHMI

Karsinoma laring adalah keganasan pada laring yang berasal dari sel epitel laring. Karsinoma laring sering terjadi pada laki-laki pada usia dekade keenam sampai dekade kedelapan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik klinis dan patologis dari penderita karsinoma laring di bagian THT-KL RSUP DR. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data rekam medis dan data histopatologi di Patologi Anatomi RSUP DR. M. Djamil Padang. Didapatkan 17 penderita karsinoma laring periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2014 dalam penelitian ini. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer dengan menggunakan distribusi frekuensi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini didapatkan distribusi frekuensi penderita karsinoma laring tersering adalah pada usia >50 tahun (94.10%) dan laki-laki (94.11%). Sesak nafas dan suara serak merupakan keluhan utama dan gejala klinis secara keseluruhan yang paling banyak ditemukan. Glotis merupakan lokasi tersering (94.11%). Sebagian besar stadium yang didapatkan adalah stadium IV (76.46%). Sebagian besar karsinoma laring adalah sel skuamosa berkeratin (88.23%). Kemudian untuk tingkat diferensiasi sel tumor, sebagian besar tumor berdiferensiasi baik (*Grade I*) dan berdiferensiasi sedang (*Grade II*) yaitu 47.05% masing-masingnya.

Kata kunci : Karsinoma Laring, Karakteristik klinis dan patologis

