

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

1. Terdapat penurunan terhadap hasil pemeriksaan sensitivitas kornea dengan alat estesiometer Cochet Bonnet pada pasien keratitis herpes simplek tipe-1
2. Terdapat peningkatan hasil pemeriksaan sensitivitas kornea dengan alat estesiometer Cochet Bonnet yang tidak signifikan sebelum pemberian asiklovir dengan setelah pemberian asiklovir selama 1 minggu (p 1,000) dan 2 minggu (p 0,160).
3. Terdapat peningkatan hasil pemeriksaan sensitivitas kornea dengan alat estesiometer Cochet Bonnet yang signifikan sebelum pemberian asiklovir dengan setelah pemberian asiklovir selama 3 minggu (p 0,003), 4 minggu (0,000), 5 minggu (p 0,000) , dan 6 minggu (p 0,000).

#### 7.2 Saran

1. Sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih lama sampai infiltrat hilang dan bisa juga melakukan penelitian pada keratitis HSV-1 berulang.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lain yang memungkinkan untuk menghitung jumlah densitas saraf kornea dan dibandingkan dengan pemeriksaan estesiometer selama pemberian obat.