


BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Rerata kadar plasma NT-proBNP pada stroke iskemik fase akut pada penelitian ini adalah $287,8 \pm 84,2$ pg/ml.
2. Derajat severitas stroke iskemik fase akut yang terbanyak pada penelitian ini adalah severitas derajat sedang.
3. Tidak terdapat hubungan antara kadar plasma NT-proBNP dengan severitas stroke iskemik pada fase akut.
4. Derajat *outcome* fungsional stroke iskemik yang terbanyak pada penelitian ini adalah *outcome* fungsional derajat berat.
5. Terdapat hubungan antara kadar plasma NT-proBNP fase akut dengan *outcome* fungsional stroke iskemik bulan-1.



Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dengan menganalisa variabel lain seperti gangguan jantung, gangguan ginjal dan infeksi yang bisa mempengaruhi kadar plasma NT-proBNP dan severitas stroke.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda untuk mengetahui kadar Nt-proBNP populasi umum yang sehat, membandingkan kadar plasma NT-proBNP dan juga dilakukan dalam beberapa kali pengukuran, terutama pada hari ke-3, ke 5 dan ke 7 sehingga dapat mengetahui kadar puncak Nt-proBNP pada stroke iskemik.

