

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Rasio neutrofil/limfosit pasien angina pektoris stabil di RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah 2,54 (0,97).
2. Rasio trombosit/limfosit pasien angina pektoris stabil di RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah 122,04 (37,84).
3. Rasio neutrofil/limfosit memiliki korelasi positif bermakna dengan stenosis arteri koroner pasien angina pektoris stabil di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
4. Rasio trombosit/limfosit memiliki korelasi positif dengan stenosis arteri koroner pasien angina pektoris stabil di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan desain kohor prospektif sehingga dapat diketahui hubungan RNL dan RTL dengan stenosis arteri koroner untuk beberapa waktu ke depan.
2. Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan pengelompokan subjek penelitian berdasarkan faktor risiko sehingga bisa diketahui nilai RNL dan RTL pasien APS berdasarkan faktor risiko.
3. Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan mempertimbangkan faktor risiko lain yang berkontribusi dalam meningkatkan proses inflamasi, seperti gaya hidup, indeks massa tubuh, dan *ankle-brachial index*.