

BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari 58 kasus kanker payudara stadium dini di Kota Padang tahun 2008-2017 yang memenuhi kriteria subjek penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi karakteristik sosiodemografi terbanyak pada rentang usia 41-50 tahun sebesar 56,9%, status menikah 89,7%, pendidikan tamat SMA 36,2%, ibu rumah tangga 63,8%. Distribusi frekuensi karakteristik klinis terbanyak meliputi premenopause 62,1%, grade II sebanyak 87,9%, tipe *Invasive Ductal Carcinoma* 77,6%, stadium IIA dan IIB masing-masing 36,2% dan progesteron reseptor positif 77,6%.
2. Tidak terdapat hubungan karakteristik klinis berbeda terhadap DFS dan OS pasien kanker payudara stadium dini di Kota Padang tahun 2008-2017.
3. Terapi adjuvan hormonal yang diberikan pada pasien premenopause yaitu Tamoxifen (53,4%), Goserelin inj + Tamoxifen (33,3%) dan Goserelin inj (5,6%). Pasien pascamenopause diberikan terapi aromatase *inhibitor* (54,5%) dan Tamoxifen (45,5%).
4. Pemberian terapi adjuvan hormonal yang berbeda pada pasien premenopause menunjukkan pengaruh yang tidak bermakna terhadap DFS ($p>0,05$) sedangkan terhadap OS pemberian terapi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang

bermakna ($p < 0,05$). Pada pasien pascamenopause pemberian terapi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang tidak bermakna terhadap *outcome* klinis pasien.

6. 2. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan dengan pasien yang lebih banyak
2. Perlu dilakukan *follow up* terhadap kepatuhan pasien dalam menjalani terapi dan faktor-faktor lain yang menjadi dapat menjadi penentu *outcomes* klinis pasien kanker payudara stadium dini

