

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi *Adverse drug reaction* penggunaan obat hipoglikemik oral pada pasien DM tipe 2 di Poliklinik penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Karakteristik sosiodemografis pasien dewasa DM tipe 2 yang mendapatkan obat hipoglikemik oral di poliklinik penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang, mayoritas pasien berjenis kelamin perempuan sebesar 51,35%, Kelompok usia terbanyak adalah kelompok usia >56 tahun sebesar 59,46%. Jenis Pekerjaan pasien dominan adalah tidak bekerja sebesar 51,35%. Status pendidikan terakhir terbanyak adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 67,57%).
2. Terdapat 8,1 % yang mengalami ADR. Obat hipoglikemik oral yang diduga menjadi penyebab timbulnya ADR yaitu metformin (mual) sebesar 5,40% dengan kategori *probable* dan *possible* dan acarbose (flatulensi) sebesar 2,70% dengan kategori *probable*

5.1 Saran

Penelitian tentang dugaan ADR sebaiknya diperlukan waktu pengamatan yang lebih lama dan bekerja sama dengan tenaga medis agar keterbatasan- keterbatasan yang terjadi dalam penelitian dapat dilakukan.