

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran efektifitas analgetik dan ADR pada pasien pasca operasi di RSUD 'Aisyiyah Padang dan Pariaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uji statistik, analgetik yang digunakan di RSUD 'Aisyiyah Padang dan Pariaman efektif untuk meredakan nyeri pasca operasi ($p < 0,05$) dimana terdapat perbedaan skala nyeri pada hari pertama dan hari ketiga setelah pemberian analgetik.
2. Kejadian ADR yang dialami pasien di RSUD 'Aisyiyah Padang setelah diberikan analgetik kombinasi tramadol dan ketorolac adalah mual (31,8%), pusing (27,3%), gatal-gatal (13,6%), muntah dan konstipasi (4,5%) dan yang tidak mengalami kejadian ADR sebanyak 36,4%, dan kejadian ADR setelah pemberian parasetamol adalah pusing (2,6%). Kejadian ADR yang dialami pasien di RSUD 'Aisyiyah Pariaman setelah diberikan analgetik kombinasi tramadol dan ketorolac adalah pusing (40%), mual (35%), muntah (15%), gatal-gatal dan konstipasi (5%) dan yang tidak mengalami kejadian ADR sebanyak 40%

5.2 Saran

5.2.1 Kepada Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian tentang nyeri pasca operasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nyeri seperti psikologi pasien sebelum operasi, pengalaman nyeri pasien sebelumnya, dan *preemptive analgesic*.

5.2.2 Kepada Rumah Sakit

Diharapkan penulisan data yang lebih lengkap pada catatan rekam medis pasien

