

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Rerata kadar Treg pada pasien Hepatitis B kronis dengan fibrosis hati berada dalam batas normal.
2. Rerata kadar Treg pada pasien hepatitis B kronis tanpa fibrosis hati berada dalam batas normal.
3. Kadar serum ALT dan AST pada pasien Hepatitis B kronis tanpa fibrosis hati berada dalam batas normal.
4. Kadar serum ALT dan AST pada pasien hepatitis B kronis dengan fibrosis hati berada batas normal sampai normal tinggi.
5. Kadar Treg lebih tinggi pada pasien Hepatitis B kronis dengan fibrosis hati dibandingkan tanpa fibrosis hati. Perbedaan ini tidak bermakna secara statistik.
6. Kadar serum ALT dan AST lebih tinggi pada pasien hepatitis B kronik dengan fibrosis hati dibandingkan tanpa fibrosis hati. Perbedaan ini bermakna secara statistik.

7.2. Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai kadar sel T Regulator pada berbagai fase infeksi hepatitis B kronis.
2. Perlu pemeriksaan ALT dan AST secara rutin sebagai pertimbangan *follow up* derajat fibrosis.