

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan obat high-alert yang dihubungkan dengan patient safety di ruang ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Mei-Juli 2018, dapat diambil kesimpulan

1. Penggunaan obat high-alert golongan analgetik opioid dengan patient safety memiliki hubungan yang signifikan, kuat dan searah, serta obat high-alert golongan sedatif dengan patient safety memiliki hubungan yang signifikan, sangat kuat dan searah.
2. Penggunaan obat high-alert golongan analgetik opioid dan sedatif di ruang ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang sesuai dan memenuhi standar keselamatan pasien (*patient safety*).

5.2 Saran

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan:

1. Dapat melakukan evaluasi pengaruh dosis obat yang diberikan terhadap efek yang dihasilkan mengingat efek berbeda pada tiap pasien bisa jadi disebabkan oleh perbedaan dosis yang diberikan.
2. Dapat dilakukan penelitian terhadap penggunaan obat high-alert dengan kelas terapi lainnya mengingat penggunaan obat high-alert di ruang ICU sangat

tinggi dan penggunaannya sangat memengaruhi keselamatan pasien sehingga diperlukan perhatian yang lebih terhadap penggunaannya.

3. Dapat dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama agar didapatkan data yang lebih bervariasi baik dari jenis obat yang digunakan maupun dosis yang digunakan.

