

**POLA DERMATOM PADA HERPES ZOSTER DI POLIKLINIK KULIT DAN  
KELAMIN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG**



**Skripsi**  
**Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai**  
**Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan**  
**Gelar Sarjana Kedokteran**

**Oleh**

**PUTRI SABILA HIDAYAT**  
**NO BP. 1410311093**

**Dosen Pembimbing**  
**1. dr. Rina Gustia, Sp.KK, FINS DV, FAADV**  
**2. Dr. dr. Satya Wydy Yenny, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2018**

**DERMATOME PATTERN OF HERPES ZOSTER IN THE  
DERMATOVENEROLOGY POLYCLINIC OF DR. M. DJAMIL  
HOSPITAL PADANG**

**By**

**Putri Sabila Hidayat**

**ABSTRACT**

Herpes zoster is a skin disease caused by reactivation of varicella zoster virus after its primary infection and characterized by the onset of a skin rash with a dermatomal distribution and accompanied by severe pain. The cases of herpes zoster have tended with increasing. This study was aimed to obtain the dermatome pattern of herpes zoster in the Dermatovenerology Polyclinic of Dr. M. Djamil Hospital Padang period 2015-2017.

This study was a descriptive study that was conducted in May 2018-August 2018. Simple size was 18 patients suited by inclusion criteria. Data were obtained from medical records of herpes zoster patients and presented in the frequency distribution tables.

The results showed that thoracic dermatome and trigeminal nerve area were most commonly involved (44.4%), within the age range of 45-64 years old (33.3%). There is no differences in events between men and women (50%). Pain is the most common major subjective complaint (88.2%) and classical grouped vesicles is the most major objective complaint (92.9%). Most patients have complications (72.2%), common complication is the neurological (38%).

**Keywords :** dermatome, herpes zoster

# **POLA DERMATOM PADA HERPES ZOSTER DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG**

**Oleh**

**Putri Sabila Hidayat**

## **ABSTRAK**

Herpes zoster merupakan penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi infeksi virus varisela zoster setelah infeksi primer yang bercirikan timbulnya ruam kulit dengan distribusi dermatomal dan disertai rasa nyeri yang hebat. Terdapat kecenderungan peningkatan kasus herpes zoster seiring bertambahnya usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dermatom pada herpes zoster di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2015-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan Mei 2018 - Agustus 2018. Sampel penelitian sebanyak 18 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Data pasien didapatkan dari rekam medik dan kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola dermatom pasien herpes zoster terbanyak ditemukan di daerah torakal dan area nervus trigeminal (44%), kelompok usia terbanyak adalah 45-64 tahun (33,3%). Tidak ada perbedaan kejadian pada laki-laki dan perempuan (50%). Nyeri merupakan keluhan utama subjektif yang paling sering (88,2%) dan munculnya vesikel merupakan keluhan utama objektif terbanyak (92,9%). Sebagian besar pasien mengalami komplikasi (72,2%), komplikasi yang sering terjadi yaitu bagian neurologis (38%).

**Kata kunci :** dermatom, herpes zoster