

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis kanker paling banyak pada pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama di RSUP dr. M. Djamil Padang adalah ca mammae dan ca glotis.
2. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama terbanyak berada di kelompok usia lansia muda dan berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sama banyak.
3. Lebih dari setengah pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama memiliki nilai IMT normal. Rerata tinggi pasien adalah 157,5 cm. Nilai tengah berat badan pasien adalah 52 kg dengan nilai minimum 39 kg dan nilai maksimum 95 kg.
4. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama memiliki kadar haemoglobin dan nilai haematokrit dibawah normal dan lebih dari setengah pasien memiliki jumlah leukosit dan trombosit normal.
5. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama memiliki nilai eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m² dan kadar SGOT, SGPT, kreatinin normal. Lebih dari setengah pasien lansia memiliki kadar albumin normal dan pada umumnya pasien memiliki kadar gula darah sewaktu normal.
6. Obat kemoterapi yang paling sering diberikan pada pasien lansia yaitu paklitaksel dan sisplatin.

6.2 Saran

1. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut dan sampel yang lebih besar mengenai faktor lain yang mempengaruhi pemberian kemoterapi pada lansia seperti status fungsional, komorbid, fungsi kognitif, dll pada pasien lansia yang menjalani kemoterapi di RSUP dr. M. Djamil Padang

2. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut dengan data yang diambil sebelum dan sesudah kemoterapi, sehingga bisa diketahui keberhasilan kemoterapi pada pasien lansia yang menjalani kemoterapi di RSUP dr. M. Djamil Padang
3. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut untuk analisis faktor - faktor yang mempengaruhi masing-masing karakteristik pasien lansia yang menjalani kemoterapi, sehingga data yang diperoleh bisa digunakan dalam evaluasi pemberian kemoterapi pada lansia di RSUP dr. M. Djamil Padang.

