

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan skor *Gleason* dengan kadar *Prostate Specific Antigen* (PSA) pada pasien karsinoma prostat di RSUP Dr.M.Djamil Padang periode 2014 – 2018 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar skor *Gleason* pasien karsinoma prostat adalah *poorly differentiated*.
2. Sebagian besar kadar PSA pasien karsinoma prostat adalah > 20 ng/mL.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara skor *Gleason* dengan kadar PSA pada pasien karsinoma prostat.

7.2 Saran

1. Bagi pihak institusi kesehatan dalam penulisan rekam medis diharapkan ditulis secara lengkap dan jelas sehingga informasi pasien yang didapat bisa lebih lengkap.
2. Bagi praktisi medis untuk dapat melakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap dalam menegakkan diagnosis karsinoma prostat sehingga dapat dilakukan tatalaksana yang tepat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi skor *Gleason* seperti volume prostat dan ukuran massa tumor untuk mengetahui hubungan faktor tersebut dengan skor *Gleason*.