

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien SSJ/NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki jumlah usia ≤ 40 tahun sama dengan usia >40 tahun.
2. Pasien SSJ/NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang lebih sering menyerang jenis kelamin perempuan.
3. Pasien SSJ/NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki durasi konsumsi obat hingga onset penyakit $11,58 \pm 16,17$ hari.
4. Pasien SSJ/NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki durasi onset penyakit hingga dirawat $8,73 \pm 9,32$ hari.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat keparahan pasien SSJ / NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang.
6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat keparahan pasien SSJ / NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang
7. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi konsumsi obat hingga onset penyakit dengan tingkat keparahan pasien SSJ / NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang
8. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi onset penyakit hingga dirawat dengan tingkat keparahan pasien SSJ / NET di bangsal rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang

7.2 Saran

1. Klinisi yang mengisi rekam medis sebaiknya mencantumkan skala SCORTEN pada semua pasien dengan diagnosis SSJ/NET untuk membantu dalam menentukan mortalitas pasien SSJ / NET di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

2. Klinisi sebaiknya mencatat secara rinci riwayat penyakit dahulu, sekarang, dan riwayat keluarga serta mencatat obat-obatan yang memungkinkan menjadi penyebab dan jika perlu melakukan tes alergi untuk memastikan obat yang paling berpengaruh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dianalisis lebih lanjut oleh peneliti lain dengan menambahkan variabel faktor prediktor lain sehingga dapat diketahui hubungan penelitian dengan faktor prediktor lain SSJ / NET yang menjadi permasalahan di masyarakat.

