

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Rerata kadar TNF- α serum pada pasien CAP meningkat dibanding nilai normal yaitu 71,69 pg/mL.
2. Rerata nilai Rasio Netrofil Limfosit pada pasien CAP meningkat dibanding nilai normal yaitu 9,48.
3. Rerata skor PSI pasien CAP adalah 134,4 yaitu CAP derajat tinggi
4. Terdapat korelasi positif dengan korelasi sedang antara kadar TNF- α serum dengan skor PSI pada pasien CAP.
5. Terdapat korelasi positif dengan korelasi sedang antara nilai RNL dengan skor PSI pada pasien CAP

7.2 Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar TNF- α serum dan nilai RNL berdasarkan skor PSI dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi jalur induksi inflamasi serta terapi yang telah didapatkan pasien yang dilakukan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap pada berbagai tingkatan layanan kesehatan.
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar TNF- α serum dan nilai RNL untuk masing-masing derajat pneumonia berdasarkan skor PSI.

