


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI  
KETIDAKCUKUPAN ASI PADA IBU MENYUSUI DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI  
NANAM KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2018**



**WITRI AFRIYENTI**

**1711316010**

**Dosen Pembimbing**

**1.Vetty Priscilla, S.Kp, M.Kep, Sp,Mat, MPH**

**2.Ns. Deswita, M.Kep. S.Kep. An**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2019**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNINERSITAS ANDALAS  
MARET 2019**

**Nama : Witri Afriyenti  
No BP : 1711316010**

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Ketidacukupan ASI  
Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Nanam  
Kabupaten Solok Tahun 2018**

**ABSTRAK**

Rendahnya pemberian ASI eksklusif dapat berdampak pada generasi penerus bangsa. Dampak tersebut dapat meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit baik pada bayi maupun ibunya seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas, kejadian diare, kerugian kognitif, terjadi nya peningkatan kanker mammae. Persepsi Ketidacukupan ASI merupakan salah satu penyebab utama kegagalan ASI eksklusif didunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi ketidacukupan ASI diwilayah kerja puskesmas Sungai Nanam Kabupaten Solok 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *crosssectional*. Sampel berjumlah 142 ibu menyusui dipilih secara *purposive sampling/proportional sampling*. Uji analisis yang digunakan adalah uji *chi-square* Hasil penelitian menunjukkan bahwa (52.8%) ibu mengalami persepsi positif terhadap ketidacukupan ASI. Umur ibu terbanyak pada kelompok 20-35 tahun (83.1%) dimana umur 20-35 tahun merupakan umur produktif secara maternal untuk hamil, melahirkan, juga menyusui, berpengetahuan cukup (45.8%), telah mendapatkan bimbingan laktasi prenatal (80.3%), mendapatkan bimbingan laktasi postnatal (78%), mempunyai niat/rencana untuk menyusui (47.2%), mendapatkan dukungan keluarga (54.2%) mendapatkan dukungan petugas kesehatan (52.8%), dan telah melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (54.2%), Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, pengetahuan, bimbingan laktasi prenatal, bimbingan laktasi postnatal, rencana menyusui, dukungan keluarga, dan dukungan petugas kesehatan, serta Inisiasi Menyusui Dini ( $p < 0.05$ ) dengan persepsi ketidacukupan ASI sedangkan faktor lama menyusui (92.3%) tidak terdapat hubungan yang bermakna ( $p > 0.05$ ), dengan persepsi ketidacukupan ASI. Diharapkan ibu menyusui selama kahamilannya dapat meningkatkan rencana/niat untuk menyusui bayinya.

Kata kunci : Persepsi Ketidacukupan ASI, Rencana Menyusui, Inisiasi Menyusui Dini

Daftar Pustaka : 84 (2004-2018)

**NURSING FACULTY  
ANDALAS UNIVERSIT  
March 2019**

**Nama : WitriAfriyenti  
Student Number : 1711316010**

***Factors Relating to Perception Insufficient breast milk for breastfeeding  
mothers in the work area of the health center of the Sungai  
Nanam River in Solok District in 2018***

**ABSTRACT**

*The low level of exclusive breastfeeding can have an impact on the nation's next generation. This impact can increase susceptibility to various diseases in both infants and mothers such as Upper Respiratory Tract Infections, diarrhea, cognitive loss, and an increase in breast cancer. Perception The inadequacy of breast milk is one of the main causes of failure in exclusive breast milk in the world. This study aims to determine the factors associated with the perception of insufficient breast milk in the work area of the community health center in Sungai Nanam, Solok Regency 2018. This research is a quantitative study with cross-sectional design. Samples totaling 142 nursing mothers were selected by purposive sampling / proportional sampling. The analysis test used was the chi-square test. The results showed that (52.8%) mothers experienced a positive perception of insufficient breast milk. Most mothers age in the group of 20-35 years (83.1%) where the age of 20-35 years is maternal productive age for pregnancy, childbirth, also breastfeeding, knowledgeable enough (45.8%), have received prenatal lactation guidance (80.3%), get postnatal lactation guidance (78%), having intentions / plans for breastfeeding (47.2%), obtaining family support (54.2%) getting support from health workers (52.8%), and having carried out Early Breastfeeding Initiations (54.2%), There was a significant relationship between age, knowledge, prenatal lactation guidance, postnatal lactation guidance, breastfeeding plan, family support, and health worker support, and Early Breastfeeding Initiation ( $p < 0.05$ ) with perceptions of inadequate breast milk while breastfeeding (92.3%) did not have a relationship which was significant ( $p > 0.05$ ), with the perception of insufficient breast milk. It is expected that breastfeeding mothers during their pregnancy can increase the plan / intention to breastfeed the baby*

**Keywords : Perception of Insufficient Breast Milk, Breastfeeding Plans Early  
Initiation of Breastfeeding**

**Bibliography : 84 (2004-2018)**

