

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai PCI intraoperatif yang tinggi (skor >15-39) lebih umum ditemukan dengan persentase 62,5% dari seluruh sampel pasien kanker ovarium stadium lanjut yang diteliti.
2. Pasien kanker ovarium stadium lanjut dengan kategori non-resektabel (residu \geq 1 cm) ditemukan lebih banyak dibandingkan kategori resektabel (residu < 1 cm), dengan persentase masing-masing sebesar 62,5% dan 37,5%.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PCI tinggi (skor >15) 100% merupakan massa tumor non-resektabel, sedangkan skor PCI rendah (skor \leq 15) semuanya tergolong kedalam massa resektabel. Berdasarkan statistik dinyatakan signifikan terdapat hubungan antara *peritoneal carcinomatosis index* intraoperatif dengan resektabilitas massa kanker ovarium stadium lanjut (p value = <0,001).

7.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan meneliti atau menambah variabel lain yang dapat di gunakan sebagai prediktor tambahan dalam memprediksi resektabilitas kanker ovarium stadium lanjut yang belum dapat dianalisis pada penelitian ini.

