

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemberian herbisida berbahan aktif Glufosinat 4000 ml/Ha, Sulfentrazon 1500 ml/Ha, dan campuran Glufosinat 3000 ml/Ha + Sulfentrazon 1000 ml/Ha, efektif dan mampu mengendalikan gulma hingga 60 HSA. Perlakuan menggunakan bahan aktif tersebut memiliki pengaruh berat kering gulma yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan penyiangan manual dan tanpa herbisida.

B. Saran

Penggunaan herbisida bahan aktif Glufosinat 4000 ml/Ha, Sulfentrazon 1500 ml/Ha, dan campuran Glufosinat 3000 ml/Ha + Sulfentrazon 1000 ml/Ha disarankan untuk mengendalikan gulma pada lahan perkebunan gambir. Dari hasil percobaan yang diperoleh, penulis menyarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang herbisida Glufosinat dan Sulfentrazon serta campuran keduanya dengan dosis yang berbeda, untuk melihat lebih lanjut pengaruh yang lebih signifikan dalam mengendalikan gulma.

