

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Karakteristik pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang berusia 36-45 tahun, ukuran tumor T2, dilakukan pembedahan, dilakukan kemoterapi, tidak dilakukan radioterapi, dan stadium 2.
2. Kejadian kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang sebesar 19,8%.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran tumor dengan kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pembedahan dengan kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
6. Riwayat kemoterapi tidak dapat dinilai.
7. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat radioterapi dengan kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
8. Terdapat hubungan yang signifikan antara stadium dengan kekambuhan pasien kanker payudara *triple negative* di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7.2 Saran

1. Pada penelitian ini diperlukan populasi pasien kanker payudara *triple negative* lebih besar.
2. Penelitian selanjutnya diperlukan faktor yang berpengaruh lainnya seperti Ki-67, grading histopatologi, invasi limfovaskular, dan status kelenjar getah bening.