

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan kadar Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF- α) pada kelompok *abortus imminens* dan kelompok usia kehamilan < 12 minggu.
2. Terdapat perbedaan kadar Progesterone-Induced Blocking Factor (PIBF) pada kelompok *abortus imminens* dan kelompok usia kehamilan < 12 minggu.

7.2 Saran

1. Pemeriksaan kadar Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF- α) dan Progesterone-Induced Blocking Factor (PIBF) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya abortus Imminens. Oleh karena itu, ibu hamil normal pada trimester 1 dengan kadar TNF- α yang tinggi atau kadar PIBF yang rendah, kemungkinan beresiko mengalami abortus imminens.
2. Diharapkan kepada petugas kesehatan agar melakukan skrining terjadinya *abortus imminens* pada setiap kunjungan awal antenatal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya *abortus* dikarenakan penanganan yang lebih cepat dan tepat dari petugas kesehatan. Informasi terkait skrining tanda, gejala dan bahaya *abortus imminens* juga dapat disampaikan kepada ibu dan keluarga sebagai media promosi baik melalui penyuluhan maupun konseling saat kunjungan kehamilan agar kesadaran



untuk mengenal adanya risiko secara lebih dini dapat ditumbuhkan dalam diri masyarakat awam.

