


**PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN KULIT UBI KAYU
DAN AMPAS TAHU YANG DIFERMENTASI DENGAN
INOKULUM WARETHA TERHADAP BOBOT HIDUP,
PERSENTASE KARKAS DAN PERSENTASE LEMAK
ABDOMEN AYAM KUB**

SKRIPSI



Oleh :

PUTTY AUGESTI
1910622003

Dibawah Bimbingan:

Prof. Dr. Ir. Mirzah, MS dan Kadran Fajrona, S.Pt., M.Pt

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PAYAKUMBUH, 2023

**PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN KULIT UBI KAYU
DAN AMPAS TAHU YANG DIFERMENTASI DENGAN
INOKULUM WARETHA TERHADAP BOBOT HIDUP,
PERSENTASE KARKAS DAN PERSENTASE LEMAK
ABDOMEN AYAM KUB**

SKRIPSI



*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Peternakan Universitas Andalas*

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PAYAKUMBUH, 2023

PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN KULIT UBI KAYU DAN AMPAS TAHU YANG DIFERMENTASI DENGAN INOKULUM WARETHA TERHADAP BOBOT HIDUP, PERSENTASE KARKAS DAN PERSENTASE LEMAK ABDOMEN AYAM KUB

Putty Augesti, dibawah bimbingan

Prof. Dr. Ir. Mirzah, MS dan Kadran Fajrona, S.Pt., M.Pt

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Kampus Payakumbuh, 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian campuran kulit ubi kayu dan ampas tahu yang difermentasi (KUKATF) dengan inokulum Waretha terhadap bobot hidup, persentase karkas, dan persentase lemak abdomen pada ayam KUB periode starter. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari R0 (ransum kontrol tanpa penggunaan KUKATF), R1 (30% KUKATF), R2 (35% KUKATF), R3 (40% KUKATF), dan R4 (45% KUKATF). Peubah yang diamati adalah bobot hidup, persentase karkas dan persentase lemak abdomen. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata ($P>0,05$) terhadap bobot hidup, persentase karkas, dan persentase lemak abdomen ayam KUB periode starter. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian KUKATF sampai level 45% dapat mempertahankan bobot hidup, persentase karkas, dan persentase lemak abdomen pada ayam KUB periode starter. Rataan bobot hidup, persentase karkas, dan persentase lemak abdomen yaitu 618,75 gr/ekor, 50,90%, dan 0,21%.

Kata kunci : KUKATF, inokulum Waretha, *Bacillus amyloliquefaciens*, bobot hidup, kualitas karkas, ayam KUB

