

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan pengetahuan dan sikap ibu terkait IMD, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI dengan kejadian *stunting* pada anak di kota Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prevalensi anak usia *stunting* 24-59 bulan di wilayah kerja puskesmas yang memiliki angka kejadian *stunting* tertinggi di Kota Padang adalah 47,8% .
2. Hampir separuh ibu pada penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait IMD, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI
3. Lebih dari separuh ibu pada penelitian ini memiliki sikap positif terkait IMD, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian *stunting* pada anak di wilayah kerja puskesmas yang memiliki angka kejadian *stunting* tertinggi di Kota Padang
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap ibu dengan kejadian *stunting* pada anak di wilayah kerja puskesmas yang memiliki angka kejadian *stunting* tertinggi di Kota Padang

7.2 Saran Penelitian

7.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya.

1. Melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda seperti pendidikan, pekerjaan ibu, dan pola asuh ibu yang dapat mempengaruhi kejadian *stunting* pada anak
2. Melakukan penelitian mengenai pengetahuan dan sikap ibu terkhusus pada satu variabel dengan kejadian *stunting* pada anak

7.2. 2 Bagi Puskesmas di kota Padang.

Tenaga kesehatan dapat meningkatkan frekuensi penyuluhan terkait IMD, pemberian ASI eksklusif dan MPASI harus optimal terutama yang mengandung protein hewani

