

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gambaran Faktor Koagulasi dan Jumlah Trombosit Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 yang Dirawat di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar pasien DM tipe 2 di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki hasil pemeriksaan PT dalam kategori normal.
2. Lebih dari separuh pasien DM tipe 2 yang dirawat di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki hasil pemeriksaan APTT memanjang.
3. Sebagian besar pasien DM tipe 2 yang dirawat di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki hasil pemeriksaan INR dalam kategori normal.
4. Lebih dari separuh pasien DM tipe 2 yang dirawat di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki hasil pemeriksaan jumlah trombosit dalam kategori normal.
5. Pasien DM tipe 2 pada penelitian ini tidak menunjukkan keadaan hiperkoagulasi atau *non-hypercoagulable state*.

### 6.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut mengenai koagulasi pada pasien diabetes melitus tipe 2 perlu dilakukan dengan pemeriksaan koagulasi lainnya yaitu pemeriksaan fungsi trombosit, *mixing study* APTT dan PT, dan kadar fibrinogen.
2. Penelitian mengenai faktor koagulasi pada karakteristik pasien diabetes melitus tipe 2 tertentu juga perlu dilakukan.