

BAB III

KESIMPULAN

Faktor risiko *early childhood caries* memiliki pengaruh terhadap terjadinya *early childhood caries* pada anak balita, dimana anak yang memiliki faktor risiko seperti asupan karbohidrat yang lebih tinggi, status sosial ekonomi keluarga yang rendah, dan *oral hygiene* yang buruk memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena ECC. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian ECC adalah frekuensi konsumsi makanan manis. Faktor asupan karbohidrat lain yang memiliki pengaruh terhadap ECC yaitu pola konsumsi ASI dan susu botol yang kurang benar. Paparan karbohidrat dalam waktu yang lama dapat meningkatkan risiko anak terkena ECC. Faktor sosial ekonomi keluarga yang memiliki pengaruh terhadap ECC adalah pendapatan dan pendidikan orang tua. Anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta pendidikan orang tua yang lebih rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut sehingga meningkatkan risiko anak terkena ECC. Faktor *oral hygiene* yang memiliki pengaruh terhadap ECC adalah menyikat gigi dan berkumur. Anak yang tidak dibiasakan menyikat gigi dan berkumur memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena ECC.