

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Rerata *Risk of Malignancy Index 2* pada pasien keganasan ovarium di RSUP Dr. M. Djamil adalah 2.263,9 (3,25)
2. Rerata *Risk of Malignancy Index 2* pada pasien non keganasan ovarium di RSUP Dr. M. Djamil adalah 47,53 (3,79)
3. Nilai diagnostik *Risk of Malignancy Index 2* sebagai penanda keganasan ovarium adalah sensitivitas 80,00%, spesifisitas 77,78%, *positive predictive value* 76,92% dan *negative predictive value* 80,77%. Nilai *positive likelihood ratio* (LR+) 3,6 dan nilai *negative likelihood ratio* (LR-) 0,26 termasuk kategori *very good*. *Risk of Malignancy Index 2* mempunyai nilai diagnostik yang sangat baik sehingga dapat digunakan sebagai penanda keganasan pada tumor ovarium.

7.2 Saran

Risk of Malignancy Index 2 dapat digunakan oleh klinisi sebagai penanda keganasan tumor ovarium agar penatalaksanaan pasien lebih baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membandingkan *Risk of Malignancy index 2* dengan penanda-penanda keganasan pada tumor ovarium.