

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Adanya perubahan ukuran tumor setelah dilakukan kemoterapi neoadjuvant, terjadi pengurangan ukuran tumor setelah dilakukan kemoterapi neoadjuvant.
2. Adanya hubungan yang tidak signifikan antara tipe histopatologi tumor dengan perubahan ukuran tumor ($P > 0,05$).
3. Adanya hubungan yang signifikan antara derajat diferensiasi tumor dengan perubahan ukuran tumor ($P < 0,05$), yakni pada derajat G3 memiliki rata-rata pengurangan ukuran tumor yang lebih besar dari pada derajat G1-G2.

7.2 Saran

1. Peneliti setelah ini hendaknya melakukan penelitian pada faktor-faktor lain yang mungkin sangat berpengaruh terhadap perubahan ukuran tumor contohnya komorbid, kepatuhan pasien, vaskularisasi dan faktor lain yang dianggap penting atau memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap respon terapi.
2. Kemoterapi neoadjuvant dapat diberikan kepada pasien kanker serviks stadium IB2 dan IIA2 untuk mengurangi ukuran tumor agar mempermudah untuk dilakukan operasi.
3. Faktor derajat diferensiasi dapat diperhitungkan sebelum dilakukan kemoterapi neoadjuvant, dimana pada derajat diferensiasi G3 memiliki respon yang baik terhadap pemberian kemoterapi neoadjuvant dibandingkan derajat G1-G2.